

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АВТОМЕТРИЯ

2005, том 41, № 2

УДК 519.24

Е. Л. Кулешов, И. А. Бабийчук

(Владивосток)

ЛИНЕЙНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
СТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ИЗВЕСТНОМ И НЕИЗВЕСТНОМ ТРЕНДЕ

Получено решение задачи оптимального линейного прогнозирования стационарного случайного процесса при известном тренде. Показано, что из этого решения следует решение задачи линейного прогноза при неизвестном тренде, если линейный прогноз тренда заменяется его оптимальной линейной оценкой. Установлена связь между ошибками прогнозов при известном и неизвестном тренде. На примере показано сильное влияние эффекта декорреляции на ошибку прогноза. Получены рекомендации для построения практических алгоритмов прогноза.

Введение. Пусть $x_r, r = \dots, t - 2, t - 1, t$, – стационарный в широком смысле случайный процесс с дискретным временем r , наблюдаемый до настоящего момента времени t , с корреляционной функцией $B_{i-j}^x = \mathbf{M}x_i x_j$ (\mathbf{M} – оператор математического ожидания). Рассмотрим задачу линейного прогноза случайного процесса x_r в следующей постановке. Пусть

$$y_{t-l-i} = \sum_{j=1}^k x_{t-i-j}, \quad l = 1, \quad (1)$$

– оценка случайной величины x_{t-l} , причем коэффициенты прогноза $1, \dots, k$ находятся из условия минимума среднеквадратической ошибки

$$\min_{1, \dots, k} \mathbf{M}(y_{t-l-i} - x_{t-l})^2. \quad (2)$$

Таким образом, соотношения (1), (2) определяют задачу линейного прогноза с минимальной среднеквадратической ошибкой случайного процесса x_r на 1 шагов вперед по отношению к настоящему моменту времени t . Для вычисления прогноза по формуле (1) используются k значений наблюдаемого процесса в моменты $t-k-1, t-k-2, \dots, t$.

Подстановка выражения (1) в (2) и решение системы уравнений

$$\frac{\partial}{\partial j} \mathbf{M}(y_{t-l-i} - x_{t-l})^2 = 0, \quad j = 1, \dots, k, \quad (3)$$

приводит к известному результату:

$$\sum_{i=1}^k B_i^x - B_{j-l+1}^x, \quad j=1, \dots, k, \quad (4)$$

– системе линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов B_1, \dots, B_k , обеспечивающих минимальное значение $\sum_{i=1}^k B_i^x$ среднеквадратической ошибки (2), которое определяется соотношением

$$\sum_{i=1}^2 B_0^x + \sum_{i=1}^k B_{i-l+1}^x - B_0^x = \sum_{i=1}^{j-1} B_i^x + \sum_{i=j+1}^k B_i^x. \quad (5)$$

В отличие от задачи прогнозирования стационарного случайного процесса в постановке (1), (2), обсуждаемой в литературе, в данной работе рассматривается задача прогнозирования при известном тренде. Дан сравнительный анализ их решений. Показано, что алгоритм оптимального прогноза при известном тренде переходит в алгоритм оптимального прогноза при неизвестном тренде, если линейный прогноз тренда (с коэффициентами, равными разности коэффициентов оптимального линейного прогноза тренда и коэффициентов оптимального линейного прогноза помехи) заменяется его оптимальной линейной оценкой. Установлена связь между ошибками прогнозов при известном и неизвестном тренде исследуемого процесса. На примере показано сильное влияние эффекта декорреляции на ошибку прогноза. Получены рекомендации для построения практических алгоритмов прогноза.

Оптимальный линейный прогноз при известном тренде. Пусть наблюдаемый процесс

$$x_r = s_r + r, \quad r = \dots, t-2, t-1, t, \quad (6)$$

представляет сумму относительно низкочастотной компоненты s_r (тренда) и высокочастотной компоненты r (помехи). Будем полагать также, что s_r и r – независимые стационарные в широком смысле случайные процессы с корреляционными функциями $B_{i-j}^s = \mathbf{M}s_i s_j$ и $B_{i-j}^r = \mathbf{M}_{i-j}$ соответственно и $\mathbf{M}_{i-j} = 0$. При этом взаимная корреляционная функция процессов s_r и r равна $\mathbf{M}s_i s_j \mathbf{M}_j = 0$ и процесс x_r имеет корреляционную функцию $B_i^x = B_i^s + B_i^r$. Рассмотрим задачу линейного прогноза процесса x_r при условии, что в моменты времени $r = \dots, t-2, t-1, t$ известны не только значения процесса x_r , но и его компонент s_r и r . Поэтому линейный прогноз случайного процесса x_r можно рассматривать как в форме (1), так и в виде суммы прогноза процесса s_r и прогноза процесса r . Пусть

$$z_{t-l} = \sum_{i=1}^k x_{t-i-1} s_{t-i-1} = \sum_{i=1}^k s_{t-i-1} \quad (7)$$

– оценка случайной величины x_{t-l} . Поскольку

$$z_{t-l} = \sum_{i=1}^k (s_{t-i-1} - s_{t-i}) s_{t-i-1} + \sum_{i=1}^k s_{t-i-1} = \sum_{i=1}^k s_{t-i-1}, \quad (8)$$

то величины a_i и b_i есть коэффициенты линейного прогноза процессов s_r и r соответственно. Определим величины a_i , b_i из условия минимума среднеквадратической ошибки $\frac{2}{z}$ прогноза z_{t-l} :

$$\frac{2}{z} \mathbf{M}(z_{t-l} - x_{t-l})^2 \min_{1, \dots, k, 1, \dots, k} \quad (9)$$

Решение этой задачи сводится к поиску минимума функции $\frac{2}{z}$ по $2k$ переменным: $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_k$. Достаточные условия минимума функции нескольких переменных [1] в данном случае имеют вид

$$\frac{\partial z}{\partial j} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial j} = 0, \quad j = 1, \dots, k, \quad (10)$$

$$Q_{i=1, j=1}^{2k, 2k} - \frac{\frac{\partial^2 z}{\partial i \partial j}}{i=j} = 0, \quad (11)$$

где $a_i, b_i, i = 1, \dots, k; 1, \dots, 2k$ — любые числа. Подставим выражение (7) в (9), тогда

$$\frac{2}{z} \mathbf{M}_{i=1}^k a_i x_{t-i-1} - \mathbf{M}_{i=1}^k a_i s_{t-i-1} - x_{t-l}^2. \quad (12)$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial j} &= 2 \mathbf{M}_{i=1}^k a_i x_{t-i-1} - \mathbf{M}_{i=1}^k a_i s_{t-i-1} - x_{t-l} - x_{t-j-1} \\ &\quad - 2 \mathbf{M}_{i=1}^k a_i B_{i-j}^x - \mathbf{M}_{i=1}^k a_i B_{i-j}^s - B_{j-l-1}^x. \end{aligned} \quad (13)$$

Из уравнений (10) и (13) следует

$$\mathbf{M}_{i=1}^k a_i B_{i-j}^x - \mathbf{M}_{i=1}^k a_i B_{i-j}^s - B_{j-l-1}^x, \quad j = 1, \dots, k. \quad (14)$$

Аналогично из (12)

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial j} &= 2 \mathbf{M}_{i=1}^k a_i x_{t-i-1} - \mathbf{M}_{i=1}^k a_i s_{t-i-1} - x_{t-l} - s_{t-j-1} \\ &\quad - 2 \mathbf{M}_{i=1}^k a_i B_{i-j}^s - \mathbf{M}_{i=1}^k a_i B_{i-j}^x - B_{j-l-1}^s. \end{aligned} \quad (15)$$

Из равенства нулю производной (15) получим

$$\sum_{i=1}^k (z_i - s_i) B_{i-j}^s = B_{j-l+1}^s, \quad j = 1, \dots, k. \quad (16)$$

Соотношения (14), (16) образуют систему $2k$ линейных уравнений относительно неизвестных $z_1, \dots, z_k, s_1, \dots, s_k$, решение которой минимизирует среднеквадратическую ошибку $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^k (z_i - s_i)^2$ прогноза s_{t-l} , если при этом выполняется условие $Q = 0$ (11).

Системе уравнений (14), (16) можно дать вторую интерпретацию. Аналогично соотношениям (1)–(4), решение $z_i, i = 1, \dots, k$, системы (16) минимизирует среднеквадратическую ошибку $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^k (z_i - s_{t-i})^2$ линейного прогноза s_{t-i} тренда. Далее, из уравнения (14) вычтем уравнение (16) и получим

$$\sum_{i=1}^k (z_i - s_i) B_{i-j} = B_{j-l+1}, \quad j = 1, \dots, k. \quad (17)$$

Следовательно, решение $z_i, i = 1, \dots, k$, системы (17) минимизирует среднеквадратическую ошибку $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^k (z_i - s_{t-i})^2$ линейного прогноза s_{t-i} помехи.

Таким образом, задача оптимального линейного прогноза (7), (9) сводится к двум задачам: прогнозу тренда (решение определяется системой (16)) и прогнозу помехи (ее решение находится из системы линейных уравнений (17)); затем прогноз s_{t-l} наблюдаемого процесса определяется суммой прогнозов тренда и помехи (формула (8)).

Квадратичная форма. Покажем, что квадратичная форма Q удовлетворяет условию (11) и, следовательно, решение системы уравнений (14), (16) минимизирует среднеквадратическую ошибку (9). Для этого представим Q через z_i, i :

$$Q = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \frac{2 \cdot 2}{z_{i-j}} z_i z_j + \sum_{i=1}^{2k} \sum_{j=1}^k \frac{2 \cdot 2}{z_{i-j}} s_i s_j + \sum_{i=1}^{2k} \sum_{j=k+1}^{k+1} \frac{2 \cdot 2}{z_{i-j}} s_i s_j$$

$$+ \sum_{i=1}^{2k} \sum_{j=k+1}^{k+1} \frac{2 \cdot 2}{z_{i-j}} z_i z_j + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \frac{2 \cdot 2}{z_{i-j}} z_i s_j + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \frac{2 \cdot 2}{z_{i-j}} s_i z_j$$

$$+ \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \frac{2 \cdot 2}{z_{i-j}} s_i s_j$$

$$\begin{array}{c}
k \quad k \quad \frac{2 \quad 2}{z} \quad k \quad k \quad \frac{2 \quad 2}{z} \\
i \quad 1 \quad q \quad 1 \quad i \quad k \quad q \quad p \quad 1 \quad q \quad 1 \quad k \quad p \quad k \quad q \\
\hline
k \quad k \quad \frac{2 \quad 2}{z} \quad k \quad k \quad \frac{2 \quad 2}{z} \\
i \quad 1 \quad j \quad 1 \quad i \quad j \quad p \quad 1 \quad j \quad 1 \quad p \quad j \\
\hline
k \quad k \quad \frac{2 \quad 2}{z} \quad k \quad k \quad \frac{2 \quad 2}{z} \\
i \quad 1 \quad q \quad 1 \quad i \quad q \quad p \quad 1 \quad q \quad 1 \quad p \quad q
\end{array} \quad (18)$$

Из (13) следует

$$\frac{2 \quad 2}{i \quad j} = 2B_{i-j}^x; \quad \frac{2 \quad 2}{i \quad j} = 2B_{i-j}^s. \quad (19)$$

Аналогично из (15) получим

$$\frac{2 \quad 2}{i \quad j} = 2B_{i-j}^s; \quad \frac{2 \quad 2}{i \quad j} = 2B_{i-j}^s. \quad (20)$$

Подставим уравнения (19) и (20) в (18), тогда

$$\begin{aligned}
Q &= 2 \sum_{i=1}^{k-1} (B_{i-j-i-j}^x - B_{i-j-k-i-j}^s - B_{i-j-i-k-j}^s + B_{i-j-k-i-k-j}^s) \\
&= 2 \sum_{i=1}^{k-1} B_{i-j-i-j}^s - 2 \sum_{i=1}^{k-1} B_{i-j}^s (-i - k - i) (-j - k - j). \quad (21)
\end{aligned}$$

Отсюда следует $Q = 0$, поскольку корреляционные функции B^s, B являются положительно-определенными [2].

Среднеквадратические ошибки прогнозов. Система уравнений (16) определяет коэффициенты i_1, i_2, \dots, i_k , линейного прогноза тренда с минимальной среднеквадратической ошибкой

$$\frac{2}{2} \mathbf{M} \sum_{i=1}^k (-i - i) s_{t-i-1} - s_{t-l}^2, \quad (22)$$

которую, аналогично соотношению (5), можно представить в виде

$$\frac{2}{2} B_0^s \sum_{i=1}^k (-i - i) B_{i-l-1}^s - B_0^s \sum_{i=1}^k (-i - i) (-j - j) B_{i-j}^s. \quad (23)$$

Так же решение системы (17) определяет коэффициенты \hat{B}_i линейного прогноза помехи с минимальной среднеквадратической ошибкой

$$\frac{2}{3} \mathbf{M}_{\frac{k}{i-1}}^{\frac{k}{i-t-i-1}} \mathbf{B}_0^2 \mathbf{B}_{\frac{k}{i-1}}^{\frac{k}{i-t-l-1}} \mathbf{B}_0^k \mathbf{B}_{\frac{k}{i-1-j-1}}^{\frac{k}{i-j-j}} \quad (24)$$

Используя соотношение (8), получим

$$\frac{2}{z} \mathbf{M}(z_{t-l} - x_{t-l})^2 = \mathbf{M}_{\frac{k}{i-1}}^{\frac{k}{i-i}} s_{t-i-1}^k s_{t-l}^k \quad (25)$$

Поскольку случайные величины s_i и s_j независимы и $\mathbf{M}_{ij} = 0$, то

$$\mathbf{M}_{\frac{k}{i-1}}^{\frac{k}{i-i}} s_{t-i-1}^k s_{t-l}^k = 0. \quad (26)$$

С учетом этого из (25) следует, что ошибка $\frac{2}{z}$ полного прогноза z_{t-l} равна сумме ошибок прогноза тренда и прогноза помехи. Если коэффициенты \hat{B}_i являются решением системы $2k$ уравнений (14), (16), то ошибка $\frac{2}{z}$ достигает своего минимального значения

$$\frac{2}{4} \frac{2}{2} \frac{2}{3}. \quad (27)$$

Соотношения между прогнозами при известном и неизвестном тренде. Представим формулу (1) прогноза при неизвестном тренде в виде

$$y_{t-l} = \sum_{i=1}^k \hat{B}_i x_{t-i-1} + (\hat{B}_k - \hat{B}_1) x_{t-k-1}. \quad (28)$$

Здесь выражение $\sum_{i=1}^k (\hat{B}_k - \hat{B}_i) x_{t-i-1}$ выполняет функцию второго слагаемого $\sum_{i=1}^k \hat{B}_i s_{t-i-1}$ в формуле (7) прогноза при известном тренде. Если $\hat{B}_1, \dots, \hat{B}_k$ – решение системы уравнений (4) и $\hat{B}_1, \dots, \hat{B}_k, \hat{B}_{k+1}, \dots, \hat{B}_k$ – решение системы (14), (16), то $\sum_{i=1}^k \hat{B}_i s_{t-i-1}$ можно рассматривать как линейный прогноз тренда с коэффициентами $\hat{B}_k - \hat{B}_1$ (\hat{B}_k – оптимального прогноза тренда) и коэффициентами \hat{B}_i (\hat{B}_i – оптимального прогноза помехи). Введем линейную оценку $\sum_{i=1}^k \hat{B}_i x_{t-i-1}$

случайной величины $\sum_{i=1}^k i s_{t-i-1}$, и коэффициенты x_1, \dots, x_k определим из условия

$$\frac{2}{s} \mathbf{M} \sum_{i=1}^k i x_{t-i-1} - \sum_{i=1}^k i s_{t-i-1} = \min_{x_1, \dots, x_k}. \quad (29)$$

Вычислим производную

$$\frac{2}{s} - 2\mathbf{M} \sum_{i=1}^k i x_{t-i-1} - \sum_{i=1}^k i s_{t-i-1} x_{t-j-1}, \quad (30)$$

затем из условия $\frac{2}{s} / \frac{2}{j} = 0$ получим

$$\sum_{i=1}^k i B_i^x - \sum_{i=1}^k i B_i^s, \quad j = 1, \dots, k, \quad (31)$$

– систему линейных уравнений относительно x_1, \dots, x_k . Решение системы (31) минимизирует ошибку $\frac{2}{s}$, поскольку, как следует из (30), квадратичная форма

$$Q_0 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \frac{\frac{2}{s}}{i-j} - \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k B_i^x B_j^s = 0. \quad (32)$$

Разность выражений (4) и (14) имеет вид

$$\sum_{i=1}^k (\sum_{i=1}^k i) B_i^x - \sum_{i=1}^k i B_i^s, \quad j = 1, \dots, k, \quad (33)$$

поэтому из (31) и (33) следует

$$x_i = -x_i, \quad i = 1, \dots, k. \quad (34)$$

Таким образом, оптимальный прогноз z_{t-l} при известном тренде (7) и прогноз y_{t-l} при неизвестном тренде (28) различаются своими вторыми слагаемыми. Причем если величина $\sum_{i=1}^k i s_{t-i-1}$ в (7) заменяется ее оптимальной линейной оценкой $\sum_{i=1}^k i x_{t-i-1} - (\sum_{i=1}^k i) x_{t-k-1}$, то прогноз z_{t-l} при известном тренде переходит в прогноз y_{t-l} при неизвестном тренде.

Дополнительная ошибка прогноза. Найдем минимальное значение $\frac{2}{s}$ среднеквадратической ошибки $\frac{2}{s}$ оценки $\sum_{i=1}^k i x_{t-i-1}$ случайной величины $\sum_{i=1}^k i s_{t-i-1}$. Далее будет показано, что $\frac{2}{5} - \frac{2}{1} = \frac{2}{4}$ – приращение ошибки

прогноза, обусловленное неизвестным трендом. Соотношение (29) можно представить в виде

$$\begin{array}{c} k \quad k \\ s \quad i \quad j \quad 1 \end{array} B_i^x \quad \begin{array}{c} k \quad k \\ 2 \quad i \quad j \quad 1 \end{array} B_i^s \quad \begin{array}{c} k \quad k \\ i \quad j \quad 1 \end{array} B_i^s. \quad (35)$$

Если коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ являются решением системы уравнений (31), то α_s^2 достигает минимального значения α_5^2 . Рассмотрим три возможных представления для α_5^2 . Подставим равенство (31) в первое слагаемое (35), тогда с учетом четности $B_{i-j}^s = B_{j-i}^s$ корреляционной функции будем иметь

$$\begin{array}{c} k \quad k \\ 5 \quad i \quad j \quad 1 \end{array} B_i^s \quad \begin{array}{c} k \quad k \\ 2 \quad i \quad j \quad 1 \end{array} B_i^s \quad \begin{array}{c} k \quad k \\ i \quad j \quad 1 \end{array} B_i^s \\ \begin{array}{c} k \quad k \\ i \quad j \quad 1 \end{array} B_i^s \quad \begin{array}{c} k \quad k \\ i \quad j \quad 1 \end{array} (\alpha_i - \alpha_j) B_i^s. \quad (36)$$

Второе представление находим заменой выражения $\begin{array}{c} k \\ j \quad 1 \end{array} B_j^s$ во втором

слагаемом (35) левой частью $\begin{array}{c} k \\ j \quad 1 \end{array} B_j^s$ равенства (31):

$$\begin{array}{c} k \quad k \\ 5 \quad i \quad j \quad 1 \end{array} B_i^x \quad \begin{array}{c} k \quad k \\ i \quad j \quad 1 \end{array} B_i^s \quad \begin{array}{c} k \quad k \\ i \quad j \quad 1 \end{array} B_i^s \\ \mathbf{M}_{\begin{array}{c} k \\ i \quad 1 \end{array}} s_t \quad \mathbf{M}_{\begin{array}{c} 2 \\ i \quad 1 \end{array}} x_t \quad \mathbf{M}_{\begin{array}{c} 2 \\ i \quad 1 \end{array}} x_t. \quad (37)$$

Наконец, третье представление минимальной ошибки получим, заменив $\begin{array}{c} k \\ j \quad 1 \end{array} B_j^s$ во втором и третьем слагаемых (35) выражением $\begin{array}{c} k \\ j \quad 1 \end{array} B_j^x$:

$$\begin{array}{c} k \quad k \\ 5 \quad i \quad j \quad 1 \end{array} (\alpha_i - \alpha_j) B_i^x. \quad (38)$$

Соотношение между ошибками. Используя выражения (27), (23), (24), получим

$$\begin{array}{c} 2 \quad 2 \quad 2 \\ 4 \quad 2 \quad 3 \end{array} B_0^x \quad \begin{array}{c} k \quad k \\ i \quad j \quad 1 \end{array} (\alpha_i - \alpha_j) (\alpha_j - \alpha_i) B_i^s \quad \begin{array}{c} k \quad k \\ i \quad j \quad 1 \end{array} B_i^s. \quad (39)$$

Теперь из (5), (39) следует

$$\begin{array}{c} 2 \quad 2 \\ 1 \quad 4 \end{array} \quad \begin{array}{c} k \quad k \\ i \quad j \quad 1 \end{array} B_i^x$$

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k (\hat{x}_{i,j} - x_{i,j}) (\hat{s}_{i,j} - s_{i,j}) B_{i,j}^s = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k (\hat{x}_{i,j} - x_{i,j}) B_{i,j}^s. \quad (40)$$

Согласно (34) $\hat{x}_{i,j} = x_{i,j}$. Подставим это выражение в (40), тогда

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^4 \left[(\hat{x}_{i,j} - x_{i,j}) (\hat{s}_{i,j} - s_{i,j}) B_{i,j}^x \right. \\ & \left. + (\hat{x}_{i,j} - x_{i,j}) (\hat{s}_{i,j} - s_{i,j}) B_{i,j}^s \right] \\ & \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \left[(\hat{x}_{i,j} - x_{i,j}) (\hat{s}_{i,j} - s_{i,j}) B_{i,j}^x + (\hat{x}_{i,j} - x_{i,j}) (\hat{s}_{i,j} - s_{i,j}) B_{i,j}^s \right] \\ & \left. \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k [(2 \hat{x}_{i,j} - x_{i,j}) B_{i,j}^x - (2 \hat{x}_{i,j} - x_{i,j}) B_{i,j}^s] \right]. \end{aligned} \quad (41)$$

В соответствии с формулой (37)

$$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^4 \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^k (\hat{x}_{i,j} - x_{i,j}) (\hat{s}_{i,j} - s_{i,j}) B_{i,j}^x B_{i,j}^s = 0. \quad (42)$$

Выражение в квадратных скобках равно нулю для любого $i = 1, \dots, k$, поскольку x_1, \dots, x_k удовлетворяют системе уравнений (31). Поэтому (42) принимает вид

$$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^4 \sum_{k=1}^2. \quad (43)$$

Таким образом, ошибка \hat{x}_1 оптимального линейного прогноза при неизвестном тренде равна сумме ошибок \hat{x}_4 и \hat{x}_5 , где \hat{x}_4 – ошибка оптимального прогноза при известном тренде и \hat{x}_5 – минимальная ошибка оценки \hat{x}_k случайной величины x_{t-i+1} .

Минимальная среднеквадратическая ошибка – невозрастающая функция аргумента k . Рассмотрим прогноз y_{t-l} и его ошибку \hat{y}_y (2). Пусть $\hat{y}_y^2(k)$ – функция k аргументов $1, \dots, k$ вида (2) и $\hat{y}_y^2(k-1)$ – функция $k-1$ аргументов $1, \dots, k-1$, аналогичная (2). Таким образом, $\hat{y}_y^2(k-1)$ – среднеквадратическая ошибка прогноза по $k-1$ значениям x_{t-k}, \dots, x_t наблюдаемого процесса. Задача нахождения минимума $\hat{y}_y^2(k)$ функции $\hat{y}_y^2(k)$ по аргументам $1, \dots, k$ совпадает с задачей нахождения условного минимума функции $\hat{y}_y^2(k-1)$ при условии $x_{t-k} = 0$. Безусловный минимум $\hat{y}_y^2(k-1)$ функции $\hat{y}_y^2(k-1)$ не больше, чем ее условный минимум при $x_{t-k} = 0$, который совпадает с безусловным минимумом $\hat{y}_y^2(k)$ функции $\hat{y}_y^2(k)$. Таким образом, $\hat{y}_y^2(k-1) = \hat{y}_y^2(k)$ – минимальная ошибка прогноза –

является невозрастающей функцией аргумента k . Очевидно, аналогичными свойствами обладают и другие ошибки линейного прогноза.

П р и м е р 1. Рассмотрим полученные соотношения в частном случае $s_r = a \text{ const}$. При этом $\mathbf{M}x_r = a$, корреляционная функция тренда $B_{i-j}^s = \mathbf{M}s_i s_j - a^2$ и уравнение (16) приводится к виду

$$\begin{array}{ccccccccc} & k & & & k & & & & \\ & & i & & 1 & & i & & \\ & i-1 & & & i-1 & & i+1 & & \end{array} \quad (44)$$

Теперь из соотношения (7) следует

$$z_{t-l} = \frac{k}{i-1} x_{t-i-1} - \frac{1}{i-1} a. \quad (45)$$

Рассмотрим систему уравнений (31), которая определяет коэффициенты a_1, \dots, a_k . В данном случае (31) принимает вид

$$\frac{k}{i-1} h_i B_{i-j}^x - a^2, \quad j=1, \dots, k, \quad (46)$$

где $h_i = \sqrt{\sum_{i=1}^k h_i^2}$. Несложно показать, что задача

$$\min_{h_1, \dots, h_k} \frac{1}{2} \mathbf{M} \sum_{i=1}^k h_i^2 x_{t-i-1}^2 - a^2 \quad (47)$$

сводится к системе уравнений (46) относительно h_i . Следовательно, решение системы (46) h_1, \dots, h_k определяет линейную оценку $a_v = \frac{1}{i-1} h_i x_{t-i-1}$ математического ожидания a с минимальной среднеквадратической ошибкой.

Теперь прогноз (28) представим в виде

$$\begin{aligned} & y_{t-l} = \frac{k}{i-1} x_{t-i-1} - \frac{1}{i-1} x_{t-i-1} \\ & \frac{k}{i-1} x_{t-i-1} - a_v + \frac{k}{i-1} x_{t-i-1} - \frac{1}{i-1} x_{t-i-1} - a_v. \end{aligned} \quad (48)$$

Сравним выражения (45) и (48). Прогноз (45) с известным математическим ожиданием содержит слагаемое $\frac{1}{i-1} x_{t-i-1} - a$, которое заменяется его оценкой $\frac{1}{i-1} x_{t-i-1} - a_v$ в формуле (48) прогноза при неизвестном математи-

ческом ожидании. Среднеквадратическая ошибка этой оценки

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{i-1} \sum_{i=1}^k \mathbf{M}(a_v - a)^2 = \frac{1}{i-1} \sum_{i=1}^k \frac{2}{a}, \quad (49)$$

где $\frac{2}{a} = \mathbf{M}(a_v - a)^2$. Соотношение (49) совпадает с результатом, полученным в [3] при исследовании линейного прогноза стационарного процесса с известным и неизвестным математическим ожиданием. В соответствии с (49) разность ошибок $\frac{2}{5} - \frac{2}{4}$ может быть значительной, если велика ошибка $\frac{2}{a}$ оптимальной оценки среднего или большим является весовой множитель $\frac{1}{i-1}$ среднего в формуле прогноза. Соотношение (45) можно представить в виде

$$z_{t-l} - a = \frac{1}{i-1} \sum_{i=1}^k (x_{t-i-1} - a). \quad (50)$$

Следовательно, прогноз при известном среднем определяется только прогнозом помехи с коэффициентом $\frac{1}{i}$. При этом можно формально рассматривать прогноз тренда как прогноз постоянной величины a с нулевой ошибкой, что следует из (22) при $s_r = a$:

$$\frac{2}{2} \cdot \frac{1}{i-1} \sum_{i=1}^k (x_{t-i} - a)^2 = 0, \quad (51)$$

поскольку справедливо равенство (44).

Пусть дополнительно x_r – белый случайный процесс с корреляционной функцией $B_0 = \frac{2}{r}$, где $\frac{2}{r} = \mathbf{M} x_r^2$ – дисперсия процесса x_r ; $B_i = 0$, если $i > 0$. Тогда $\sum_{i=1}^{i-1} B_{i-1} = 0$, и в соответствии с формулой (24) ошибка прогноза помехи $\frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ и не зависит от числа k . При этом система уравнений (17) имеет решение $\frac{1}{i} = 0$, $i = 1, \dots, k$. Поэтому в оптимальном прогнозе (50) не используется ни один отсчет процесса x_r – это прогноз по среднему $z_{t-l} = a$. Процесс, отличный от белого, имеет некоторые значения $B_i = 0$, $i > 0$, и это позволяет уменьшить ошибку (24), если $\sum_{i=1}^{i-1} B_{i-1} = 0$ для некоторых $i \in [1, k]$.

П р и м е р 2. Рассмотрим простейший вариант задачи линейного прогноза, позволяющий вычислить ошибки $\frac{2}{1}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{2}{5}$ в аналитической форме и подобрать такие параметры процессов s_r , x_r , при которых ошибка $\frac{2}{1}$ прогноза при неизвестном тренде значительно превосходит ошибку $\frac{2}{4}$ прогноза при известном тренде. Пусть $l = 1$, $k = 2$, тогда система линейных уравнений (17), определяющая коэффициенты оптимального прогноза помехи, имеет решение

$$\frac{1}{1} = \frac{B_1 (B_0 - B_2)}{(B_0)^2 - (B_1)^2}; \quad \frac{2}{2} = \frac{B_0 B_2 - (B_1)^2}{(B_0)^2 - (B_1)^2}. \quad (52)$$

Выражения (52) подставим в (24) и будем иметь


$$\frac{2}{3} B_0 - B_1 \frac{B_1 (B_0 - B_2)}{(B_0)^2 - (B_1)^2} - B_2 \frac{B_0 B_2 - (B_1)^2}{(B_0)^2 - (B_1)^2}. \quad (53)$$

Формула, аналогичная (53), может быть получена и для ошибки \hat{x}_2^2 прогноза тренда. Для этого при $l=1, k=2$ решается система уравнений (16).

Пусть $s_r = A_1 \cos(\omega_1 r + \phi_1)$, где амплитуда A_1 , частота ω_1 , шаг дискретизации по времени – детерминированные величины и начальная фаза ϕ_1 – непрерывная случайная величина с плотностью вероятности $f(x)$ (2.1), если $x \in [0, 2\pi]$, и $f(x) = 0$, если $x \notin [0, 2\pi]$. Тогда s_r – стационарный в широком смысле случайный процесс с математическим ожиданием $\mathbf{M}s_r = 0$ и корреляционной функцией $B_i^s = (A_1^2/2) \cos(\omega_1 i)$. Пусть помеха r задается аналогичной моделью $r = A_2 \cos(\omega_2 r + \phi_2)$ с математическим ожиданием $\mathbf{M}r = 0$ и корреляционной функцией $B_i^r = (A_2^2/2) \cos(\omega_2 i)$ и случайные величины ϕ_1 и ϕ_2 независимы. На рисунке представлены графики корреляционных функций B_i^s , B_i^r .

Зададим следующие параметры процессов s_r , r . Пусть периоды $T_1 = 2/\omega_1$ и $T_2 = 2/\omega_2$ связаны соотношением $T_1 = 3T_2$, а шаг дискретизации по времени – $T_1/8$. При этом $B_0^s = A_1^2/2$, $B_0^r = A_2^2/2$, $B_1^s = A_1^2/2\sqrt{2}$, $B_1^r = A_2^2/2\sqrt{2}$, $B_2^s = 0$, $B_2^r = 0$. Подстановка этих результатов в (53) приводит к $\hat{x}_3^2 = 0$. Аналогично ошибка прогноза тренда $\hat{x}_2^2 = 0$. Полученные результаты вполне ожидаемы, поскольку любая реализация процесса s_r (как и процесса r) – гармоническая функция и ее оптимальный прогноз по двум отсчетам вычисляется точно, с нулевой ошибкой. Однако задача прогнозирования процесса x_r при неизвестном тренде в данном примере существенно сложнее. Например, выбирая $A_1 = A_2 = A$, получим $B_0^x = A^2$, $B_1^x = 0$, $B_2^x = 0$, $B_3^x = 0$ и только $B_4^x \neq 0$ (см. рисунок). Поэтому прогноз x_r по одному, двум, трем отсчетам эквивалентен прогнозу белого процесса, при этом ошибка $\hat{x}_1^2 = B_0^x = A^2$ и ошибка суммы прогнозов двух гармоник s_r и r для $k=1, 2, 3$ равна $\hat{x}_4^2 = 0, 5A^2; 0; 0$ соответственно.

Таким образом, в этом примере ($k=2, 3$) подобраны параметры процессов s_r , r , обеспечивающие сильный выигрыш в точности прогноза с известным трендом по сравнению с прогнозом при неизвестном тренде. Причиной



Корреляционные функции тренда B_i^s и помехи B_i^r

снижения точности прогноза является эффект декорреляции процесса x_r , при сложении его компонент s_r и x_r (см. рисунок).

Заключение. Среднеквадратическая ошибка оптимального линейного прогноза является невозрастающей функцией числа k , поэтому в алгоритмах прогноза к необходимо выбирать достаточно большим. Это позволит использовать все ненулевые значения корреляционной функции B_i^x и, следовательно, минимизировать ошибку. Подходящей оценкой числа k здесь может быть оценка интервала корреляции исследуемого процесса x_r . При этом число k может оказаться весьма большим (пример 2). Однако в задачах прогнозирования тренд и корреляционная функция B_i^x , как правило, неизвестны. Поэтому задача линейного прогноза формулируется в виде соотношений (1), (2), формально не требующих знания тренда, а решение задачи сводится к решению системы линейных уравнений (4), в которой неизвестная корреляционная функция заменяется ее оценкой. Этот подход осложняется тем, что решение системы уравнений (4) является некорректно поставленной задачей [4] и с ростом k проявляется неустойчивость численного решения, приводящая к необходимости выбора малого k . Но при этом возможно появление эффекта декорреляции и, следовательно, значительной ошибки прогноза. Поэтому, если допускает постановка задачи, полезной может оказаться процедура декомпозиции исследуемого процесса x_r на квазигармоники, для каждой из которых задача прогнозирования удовлетворительно решается при малом k , затем прогноз исследуемого процесса находится как сумма прогнозов всех его компонент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бронштейн И. Н., Семеняев К. А. Справочник по математике. М.: Наука, 1986.
2. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. М.: Сов. радио, 1974. Кн. 1.
3. Кулешов Е. Л. Линейное прогнозирование стационарных случайных процессов при известном и неизвестном математическом ожидании // Автометрия. 2001. № 6. С. 114.
4. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1979.

Дальневосточный государственный университет,
E-mail: kuleshov@lemoi.phys.dvgu.ru

Поступила в редакцию
9 марта 2004 г.