

## Структура потенциального энтомокомплекса в питании летучих мышей равнинного Среднего Зауралья

Е. М. ПЕРВУШИНА<sup>1</sup>, Г. А. ЗАМШИНА<sup>1</sup>, Н. В. НИКОЛАЕВА<sup>1</sup>, А. В. ИВАНОВ<sup>1</sup>,  
В. Н. ОЛЬШВАНГ<sup>1</sup>, Т. С. КОСТРОМИНА<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Институт экологии растений и животных УрО РАН  
620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202

E-mail: *pervushina@ipae.uran.ru, galinka\_1976@mail.ru, zoovginnv@pm.convex.ru,*  
*fluegel@yandex.ru, olschw@mail.ru*

<sup>2</sup> Свердловский областной краеведческий музей  
620151, Екатеринбург, Глаeпочтамт, а/я 207  
E-mail: *kostromina\_ts@mail.ru*

Статья поступила 20.03.2014

Принята к печати 08.07.2014

### АННОТАЦИЯ

Изучена таксономическая и размерная структура сообщества сумеречных иочных насекомых равнинного Среднего Зауралья. В его составе отмечены представители 10 отрядов, преобладают насекомые мелких (до 5 мм) и средних (до 20 мм) размеров тела. Данное сообщество насекомых рассматривается как потенциальная кормовая база для летучих мышей – потенциальная трофическая ниша. Обсуждается влияние пищевых предпочтений на возможность расселения неморальных видов летучих мышей в районе исследований.

**Ключевые слова:** сообщество очных насекомых, летучие мыши, питание, Средний Урал.

Трофические связи и конкуренция за пищевые ресурсы являются важными видами взаимодействий между живыми организмами. Они формируют структуру биоценоза и определяют разнообразие живых форм в его составе. Настоящая работа посвящена изучению разнообразия сумеречных иочных насекомых, которые являются потенциальными кормовыми объектами для летучих мышей (*Chiroptera, Vespertilionidae*). Взаимодействие этих двух групп животных изучено недостаточно. Летучие мыши в массе поедают насекомых, среди которых много вреди-

телей лесного и сельского хозяйства, а также переносчиков опасных инфекционных заболеваний, таких как малярия, филяриозы и различные комаринные энцефалиты [Николаева, 2002]. Оценка структуры рациона рукокрылых позволяет выявить группы поедаемых членистоногих только на уровне крупных таксонов (классов и отрядов), определение до вида или семейства возможно в редких случаях. Поскольку летучие мыши, склоняя всего, ловят всех насекомых в пределах своего охотниччьего участка [Курсков, 1981], то знания о рационе животных можно до-

полнить сведениями о структуре сообществ ночных насекомых – потенциальной добычи большинства видов в умеренных широтах. Но это осложняется тем, что имеющиеся в литературе энтомологические исследования обычно сводятся к изучению разнообразия конкретных групп членистоногих, а комплексных работ мало, и они в большинстве своем содержат разрозненные и устаревшие сведения.

Для территории Урала и прилегающих равнинных районов пищевые связи летучих мышей выявлены слабо, а сведения о разнообразии ночных насекомых ограничиваются изучением отдельных групп [Ольшванг и др., 2004; Замшина, 2003; и др.]. Известно, что на примыкающих к Уралу участках Западно-Сибирской равнины (Зауралье) происходит уменьшение видового разнообразия рукокрылых главным образом за счет неморальных видов [Большаков и др., 2005]. В теплый период года это, вероятно, обусловлено бедной в равнинных boreальных лесах кормовой базой. Поэтому нас интересовали пищевые связи рукокрылых с насекомыми именно на этой территории – конкретнее, район равнинного Среднего Зауралья. Необходимым этапом таких исследований стало изучение таксономической и размерной структуры природного энтомокомплекса, формирующего потенциальную кормовую базу летучих мышей в этом районе. Полученные на данном этапе результаты изложены в настоящей работе.

#### МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на территории и в окрестностях Экологического научно-просветительского центра “Скородум” ( $57^{\circ}34'$  с. ш.,  $62^{\circ}43'$  в. д., с. Скородумское, Ирбитский р-н Свердловской обл.). Изучаемый район расположен в той части Западно-Сибирской равнины, которая примыкает к восточному склону Среднего Урала, и относится к подзоне южной тайги равнинного Среднего Зауралья на границе с подзоной сосново-березовых предлесостепных лесов [Лесорастительные условия..., 1973].

Сбор потенциальных кормовых объектов рукокрылых – сумеречных и ночных насе-

комых – проводили с 10 по 30 июля 2011 г. каждые три дня. Это время года выбрано для исследований не случайно. В июле у летучих мышей появляется молодняк, и значит, существенно возрастает потребление кормовых ресурсов. Точка сбора насекомых располагалась в центре территории в  $20\text{ км}^2$ . Ранее в ее пределах нами проводились отловы рукокрылых (Chiroptera: Vespertilionidae) и сбор их экскрементов для изучения питания фонового вида – двухцветного кожана *Vesperpeltilio murinus* L., после чего животные выпускались в природу [Первушина, Первушин, 2011; Гизуллина, 2013]. Для отлова насекомых использовали световую ловушку механического типа с ртутной лампой Philips ML (250 Вт). Ловушка работала с 23.00 до 5.00. В то же время в месте расположения ловушки проводили измерение температуры воздуха и влажности с помощью электронного термогигрометра RST (Швеция), учитывали максимальное и минимальное значения. Точка сбора располагалась на территории села в 200 м от р. Бобровка (ширина русла 5–7 м) и в 1 км от места ее слияния с р. Ирбит (ширина русла 10–20 м). С одной стороны к селу примыкают неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, на противоположной стороне, в 200 м от точки сбора, расположен значительный по площади лесной массив. В этом районе обычны темнохвойные леса с участием сосны, ели, пихты с незначительной примесью лиственных пород – осины, березы, рябины и липы. Луговые сообщества представлены злаками и разнотравьем. В пойме луга чередуются с древесно-кустарниковыми сообществами, в которых эдификаторами являются черемуха, ольха и хмель [Лесорастительные условия..., 1973]. На территории деревни большое количество плодовых и декоративных растений (яблоня, вишня, калина, рябина, слива, сирень, смородина), отмечены одиночные тополя.

Отловленную массу насекомых выкладывали в пластиковые контейнеры, предварительно завернув в газету; затем сборы помещали в морозильную камеру. Это позволяло быстро фиксировать весь материал и предотвращать повреждение отдельных систематически важных органов насекомых. Двукрылых (Diptera) фиксировали отдельно

в 70%-ном этиловом спирте. Дальнейшее определение и измерение членистоногих проводили в лабораторных условиях. Для большинства насекомых выделены три размерные категории: мелкие формы (длина тела со сложенными крыльями <10 мм), средние (10–20 мм), крупные (>20 мм); для бабочек (*Lepidoptera*) – пять категорий с учетом длины тела и толщины брюшка: тонкотельные мелкие (<10 мм), тонкотельные средние (10–20 мм), толстотельные мелкие (<10 мм), толстотельные средние (10–20 мм), толстотельные крупные (>20 мм). Определение по возможности проводили до вида или подсемейства (*Hymenoptera*). Часть материала не удалось определить – отряды *Hemiptera*, *Ephemeroptera*. Определение только до семейства проведено для отряда *Neuroptera*, подотряда *Brachycera* и *Cicadoidea*, в ряде случаев – для отрядов *Coleoptera* и *Lepidoptera* (*Microlepidoptera*). В определении материала участвовали Н. В. Николаева (*Diptera*, *Homoptera*, *Hemiptera*, *Raphidioptera*, *Ephemeroptera*, класс *Arachnida*), Г. А. Замшина (*Lepidoptera*), А. В. Иванов (*Coleoptera*), Т. С. Костромина (*Hymenoptera*), В. Н. Ольшванг (*Trichoptera*).

В ходе работы отловлено 16 304 экземпляра членистоногих из двух классов 12 отрядов 79 семейств; определено 220 видов. Математическую обработку данных проводили с использованием пакета программ *Statistica for Windows 6.0.* и *Excel*. Рассчитывали коэффициент корреляции Спирмена и Кендалла, а для нормального распределения – Пирсона. Сравнение рационов разных видов рукокрылых и сравнение сообществ насекомых-фотоксенов (насекомых, летящих на свет по Г. Н. Горностаеву [1984]) проводили с помощью индекса сходства Сёренсена – Чекановского ( $K_{sc}$ ), позволяющего делать оценку без учета количественных данных [Песенко, 1982]. Для описания ширины трофической ниши рукокрылых использовали литературные данные об обилии поедаемых групп насекомых и применяли индекс полидоминантности (разнообразия) Симпсона [Песенко, 1982]:  $D = 1/\Sigma(p_i)^2$ , где  $p_i$  – доля ресурса  $i$  в общем спектре используемых видом ресурсов (компонентов типа ресурса). Верхний предел  $D$  определяется числом выбранных вариантов ресурса (числом таксонов добычи). Для рас-

чета ширины потенциальной трофической ниши использовали данные обилия отрядов насекомых в сборах светоловушкой (табл. 1). Степень перекрывания трофических ниш ( $j$  и  $k$ ) оценивали по этим же показателям с помощью индекса Мориситы [Песенко, 1982]:  $I_{jk} = 2\sum p_{ij}^* p_{ik} / \Sigma(p_{ij}^2 + p_{ik}^2)$ .

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

**Структура энтомокомплекса.** По результатам наших исследований в составе сообщества сумеречных иочных насекомых в условиях равнинного Среднего Зауралья отмечены представители 10 отрядов (см. табл. 1). Самые многочисленные – отряды *Diptera* (56,6 %), *Lepidoptera* (12,9 %) и *Trichoptera* (10,1 %). Средняя численность пробы за шесть дней учета составила  $2982,2 \pm 145,13$  экз./учет, максимальная – 9348 экз./учет, минимальная – 248 экз./учет. Помимо насекомых в пробах найдены в небольшом количестве паукообразные (подклассы клещи (*Acari*) и пауки (*Araneae*)). В настоящей работе мы не рассматриваем эти группы членистоногих как элементы потенциальной кормовой базы рукокрылых, хотя они также встречаются в их экскрементах. Пауки являются пищевыми объектами для многих видов, а клещи попадают в пищу летучих мышей вместе со своими хозяевами – насекомыми (жуками и ручейниками) [Shiel et al., 1991].

За весь период наблюдений в сборах изменялось соотношение численности насекомых разных отрядов (рис. 1). Стабильными компонентами в разных суточных пробах оставались *Diptera*, *Lepidoptera*, *Trichoptera*, *Ephemeroptera*, *Hymenoptera*. Как известно, такого рода изменения в структуре энтомокомплекса зависят не только от непрерывно меняющегося состояния популяций, но и от множества внешних погодных факторов. Все эти факторы действуют в изменчивых и сложных сочетаниях, а разные группы насекомых-фотоксенов неодинаково к ним чувствительны [Горностаев, 1984]. Отмеченные нами таксономическое разнообразие (на уровне семейств) и численность насекомых положительно коррелируют с очными температурами окружающей среды ( $r = 0,82$ ;  $r = 0,94$  соответственно;  $p < 0,05$ ). Обратный эффект

Таблица 1

## Результаты отлова членистоногих светоловушкой, июль 2011 г.

Членистоногие	$M \pm m$	Число видов	Членистоногие	$M \pm m$	Число видов
Класс Arachnida			Семейство Notodontidae	$2 \pm 0,6$	6
Подкласс Acari	$29 \pm 13,5$	—	Семейство Noctuidae	$179,8 \pm 42,6$	80
Подкласс Araneae	$1,25 \pm 0,3$	—	Семейство Geometridae	$28,3 \pm 12,0$	26
Класс Insecta			Семейство Tortricidae	$38 \pm 18,39$	—
Отряд Ephemeroptera	$42,2 \pm 18,18$	—	Семейство Pyralidae	$81 \pm 53,98$	—
Семейство Baetidae	—	—	Семейство Yponomeutidae	$7 \pm 1,8$	—
Семейство Brachycercidae	—	1	Другие Microlepidoptera	$28,8 \pm 11,84$	—
Отряд Hemiptera	$33,3 \pm 11,43$	—	Отряд Diptera	$1689 \pm 1028,2$	—
Семейство Miridae	—	—	Подотряд Nematocera		
Семейство Lygaeidae	—	—	Семейство Tipulidae	$3,7 \pm 0,9$	1
Семейство Corixidae	—	—	Семейство Limoniidae	$8,8 \pm 3,83$	1
Семейство Berytidae	—	—	Семейство Cylindrotomidae	$2 \pm 0,33$	—
Отряд Homoptera	$316 \pm 97,36$	—	Семейство Mycetophilidae	$59,8 \pm 28,5$	3
Семейство Aphididae	$15,5 \pm 4,96$	10	Семейство Sciaridae	$4 \pm 0,66$	4
Семейство Cicadellidae	$300,5 \pm 97,98$	—	Семейство Cecidomyiidae	$24,2 \pm 13,62$	2
Отряд Hymenoptera	$29,8 \pm 14,1$	—	Семейство Psychodidae	$5,7 \pm 1,51$	—
Семейство Ichneumonidae	$8 \pm 4,05$	8*	Семейство Anisopodidae	$2,3 \pm 0,65$	—
Семейство Braconidae	$9,8 \pm 5,24$	8*	Семейство Scatopsidae	$3 \pm 0,5$	—
H/сем. Proctotrupoidea	$2 \pm 0,33$	—	Семейство Dixidae	$2,5 \pm 0,65$	1
Неопределенные	$16 \pm 7,4$	—	Семейство Chaoboridae	$16 \pm 3,61$	2
Отряд Coleoptera	$129,8 \pm 85,19$	—	Семейство Culicidae	$9,2 \pm 3,0$	8
Семейство Silphidae	$6,3 \pm 3,57$	2	Семейство Simuliidae	$35,3 \pm 11,0$	—
Семейство Tenebrionidae	$5,6 \pm 4,49$	1	Семейство Ceratopogonidae	$902 \pm 548,35$	3
Семейство Hydrophilidae	$26,2 \pm 20,01$	6	Семейство Chironomidae	$531,2 \pm 322,7$	4
Семейство Carabidae	$4,8 \pm 2,9$	7	Подотряд Brachycera		
Семейство Scarabaeidae	$5,8 \pm 3,03$	5	Orthorrhapha		
Семейство Heteroceridae	$17,8 \pm 15,38$	1	Семейство Stratiomyidae	$1 \pm 0,16$	1
Семейство Ptinidae	$1,2 \pm 0,98$	1	Семейство Scenopinidae	$5 \pm 1,47$	—
Семейство Staphylinidae	$10,5 \pm 2,94$	—	Семейство Asilidae	$2 \pm 0,33$	1
Семейство Scirtidae	$11,5 \pm 3,34$	1	Семейство Empididae	$2 \pm 0,33$	—
Семейство Kateretidae	$5,5 \pm 1,16$	—	Семейство Hybotidae	$1 \pm 0,16$	—
Семейство Cerambycidae	$0,5 \pm 0,5$	1	Семейство Dolichopodidae	$53,5 \pm 35,13$	2
Семейство Curculionidae	$1 \pm 0,21$	—	Cyclorrhapha		
Семейство Mycetophagidae	$0,2 \pm 0,16$	1	Семейство Lonchopteridae	$13 \pm 2,1$	1
Семейство Dytiscidae	$6,2 \pm 4,6$	2	Семейство Phoridae	$19 \pm 5,75$	1
Семейство Mordellidae	$0,2 \pm 0,16$	1	Семейство Syrphidae	$1 \pm 0,16$	1
Семейство Cryptophagidae	$6 \pm 1,0$	1	Семейство Pipunculidae	$3,5 \pm 0,98$	—
Отряд Neuroptera	$1 \pm 0,21$	—	Семейство Psilidae	$7 \pm 1,16$	—
Семейство Chrysopidae	$1 \pm 0,21$	—	Семейство Sciomyzidae	$9,5 \pm 2,61$	—
Отряд Raphidioptera	$1 \pm 0,16$	—	Семейство Sepsidae	$1 \pm 0,16$	—
Семейство Raphidiidae	$1 \pm 1,16$	1	Семейство Agromyzidae	$80 \pm 34,6$	—
Отряд Trichoptera	$301,7 \pm 200,9$	—	Семейство Chloropidae	$35,7 \pm 15,0$	—
Семейство Limnophilidae	—	3	Семейство Heleomyzidae	$4 \pm 1,0$	—
Семейство Hydropsychidae	—	3	Семейство Sphaeroceridae	$1 \pm 0,16$	—
Семейство Leptoceridae	—	3	Семейство Drosophilidae	$3,3 \pm 0,98$	—
Семейство Hydroptilidae	—	1	Семейство Ephydriidae	$8,7 \pm 3,56$	—
Отряд Lepidoptera	$389,3 \pm 126,5$	—	Семейство Scatophagidae	$2 \pm 0,49$	—
Семейство Arctiidae	$7,8 \pm 2,93$	8	Семейство Anthomyiidae	$9,5 \pm 2,78$	—
Семейство Lasiocampidae	$1 \pm 0,33$	1	Семейство Muscidae	$5,3 \pm 1,54$	—
Семейство Sphingidae	$1 \pm 0,36$	4	Семейство Calliphoridae	$2 \pm 0,33$	1

П р и м е ч а н и е.  $M \pm m$  — среднее число экземпляров за 6 дней учетов и его ошибка, \* — число подсемейств.




Рис. 1. Динамика структуры энтомокомплекса равнинного Среднего Зауралья (отловы светоловушкой, 2011 г.)

наблюдался при увеличении влажности в дни с ночной температурой ниже 17 °C ( $r = -0,77$ ;  $r = -0,56$  соответственно;  $p < 0,1$ ). Максимальные значения разнообразия и численности насекомых отмечались при средних показаниях ночной температуры воздуха 17,1–20,1 °C (см. рис. 1) и влажности 66–68,5 %.

В сравнении с литературными данными о структуре сообществ ночных насекомых, которые получены также с помощью светоловушки [Коломиец, Терсков, 1963; Горностаев, 1984], энтомокомплекс Среднего Зауралья по числу семейств (79) занимает среднее положение между энтомокомплексами Европейской части России (120 семейств) и Западной Сибири (42 семейства). Разнообразие ночных насекомых изучаемой территории на уровне отрядов имеет сходные черты с разнообразием насекомых, обитающих в таежных лесах Западной Сибири ( $K_{sc} = 0,5$ ), но на уровне семейств наибольшее сходство отмечается с разнообразием насекомых европейской части

России ( $K_{sc} = 0,4$ ). В обоих случаях коэффициент сходства имеет невысокие значения.

В составе энтомокомплекса Среднего Зауралья отмечаются главным образом транспалеарктические и трансевразийские виды насекомых (60,7 %), в широтном градиенте большинство видов (65,3 %) имеет полизональное и умереннопоясное (температное) распространение.

Самой многочисленной группой летящих на свет насекомых в наших сборах являются Diptera (см. табл. 1). Среди длинноусых двукрылых (подотряд Nematocera) отмечены долгоножки (Tipulidae) *Tipula paludosa* Mg., лимониды (Limonidae) *Pilaria nemoralis* Mg., хаобориды (Chaoboridae) *Chaoborus pallidus* F., *Mochlonyx culiciformis* Deg., земноводные комары (Dixidae) *Dixa obscura* Sw., кровососущие комары (Culicidae) *Culiseta alaskaensis* Ludl., *Ochlerotatus communis* Deg., *Och. punctator* Kirby, *Och. intrudens* Dyar, *Och. cataphylla* Dyar, *Aedes cinereus* Mg., *Culex pipiens* L.,

*C. torrentium* Mart. Отмечены такие компоненты гнуса, как мошки (Simuliidae), мокрецы (Ceratopogonidae). Некровососущие мокрецы представлены в массе *Atrichopogon meloesugans* Kieff. и единичными экземплярами *Dasychelea obscura* Winn. Среди кровососущих мокрецов встречаются единичные экземпляры *Culicoides punctatus* (Mg.). В сборах также многочисленными являются хирономиды (Chironomidae) *Chironomus plumosus* L., *Ch. annularius* Mg., *Cricotopus silvestris* F.

В сборах велико разнообразие короткоусых двукрылых (подотряд Brachycera) – 23 семейства, что мы связываем с наличием в изучаемом районе больших площадей луговой растительности. Для сравнения, в уловах светоловушкой на территории таежных лесов Западной Сибири отмечено девять семейств короткоусых двукрылых [Коломиец, Терсков, 1963], а для Европейской части России – 25 семейств [Горностаев, 1984]. Наиболее многочисленны в наших сборах представители семейств Dolichopodidae (*Hydrophorus* sp., *Medetera* sp.), Agromyzidae, Chloropidae и Phoridae (*Megaselia* sp.) (см. табл. 1). Отмечены также немногочисленные Scatophagidae, Stratiomyidae (*Odontomyia* sp.), Lonchopteridae (*Lonchoptera lutea* Pauz.), Syrphidae (*Erystalis intricarius* L.).

Второй по численности группой насекомых оказались чешуекрылые (Lepidoptera). В основном это представители семейств Noctuidae, Pyralidae, Tortricidae и Geometridae (см. табл. 1). *Xestia ditrapezium* (Den. & Schiff.), *Mythimna ferrago* (F.), *M. impura* (Hbn.), *Scopula chenopodiata* (L.) и *Caradrina morpheus* (Hufn.) отмечены нами как массовые. В экологическом отношении большинство видов чешуекрылых – мезофильные формы, связанные с лесными (38,5 %) и луговыми (38 %) растительными сообществами.

В сборах также в массе попадались ручейники (Trichoptera), развитие которых, как и большинства двукрылых (Nematoocera), тесно связано с водными биотопами (см. табл. 1). Отмечены представители семейств Hydropsychidae – *Hydropsyche bulgaromanorum* Mal., *H. guttata* Pict., *H. saxonica* McL.; Leptoceridae – *Mystacides azurea* (L.), *M. longicornis* (L.), *Ceraclea excise* (Mort.); Limnephilidae – *Limnephilus* sp., *L. lunatus* Curt., *L. fuscinervis* (Ztt.); Hydroptilidae – *Hydroptile* sp.

Отряд жесткокрылые (Coleoptera) в сборах представлен 16 семействами (см. табл. 1). Преобладают насекомые, тесно связанные с водными и прибрежными биотопами – Hydrophilidae, Heteroceridae и Dytiscidae (58,8 % от общего числа экземпляров), что, вероятно, можно объяснить расположением точки сбора вблизи реки и заболоченностью прибрежных лугов. В меньшем количестве отловлены обитатели открытых пространств и лугов (21,4 %) – представители семейств Carabidae, Tenebrionidae, Scirtidae, Scarabaeidae, Kateretidae и некрофаги сем. Silphidae. Лесные виды в сборах представлены единичными экземплярами (сем. Cerambycidae, Curculionidae, Muscetophagidae). Отмечены отдельные особи точильщиков Ptinidae и в большом количестве Staphylinidae.

Среди паразитических перепончатокрылых (Hymenoptera) в пробах встречались представители двух надсемейств: Ichneumonoidea (Ichneumonidae, Braconidae) и Proctotrupoidea, последние малочисленны и не определены до более низких таксонов (см. табл. 1). Из Ichneumonidae отмечены следующие подсемейства: Tryphoninae (*Natelia* sp.), Mesochorinae, Cthenopelmatinae (*Opheltes flavipterus* (Grav.)), Cryptinae, Ophioninae, Ichneumoninae, Diplazontinae, Banchinae. Из Braconidae отмечены подсемейства Rogadinae (*Aleiodes unipunctator* (Thunb.), *A. seriatus* (H.-Sch.)), Alysiinae (*Phaenocerpa* sp.), Opiinae (*Biosteres carbonarius* (Nees)), Euphorinae (*Meteorus* sp., *Zele* sp.), Orgilinae, Cheloninae (*Phanerothoma* sp.), Brachistinae, Microgasterinae.

Равнокрылые (Homoptera) представлены семействами Aphididae и Cicadellidae. Среди Aphididae отмечены *Euceraphis punctipennis* Zett., *Aphis fabae* Scop., *A. farinosa* Gmel., *A. grossulariae* Kalt., *A. nasturtii* Kalt., *A. craccivora* Koch, *A. pomi* Deg., *A. urticata* F., *Hyperrormyza pallidus* H. R. L., *Brachycaudus helichrysi* Kalt.

Среди настоящих сетчатокрылых (Neuroptera) отловлены единичные представители семейства Chrysopidae (см. табл. 1), а в 2012 г. поймана одна особь *Hemerobius* sp. (Hemerobiidae). Кроме того, в сборах 2011 г. найден один экземпляр верблюдки *Raphidia* sp. (Raphidioptera).

Что касается размерной структуры изученного энтомокомплекса, то в его составе




Рис. 2. Размерная структура энтомокомплекса равнинного Среднего Зауралья (отловы светоловушкой, 2011 г.). Обозначения: 1 – Lepidoptera, 2 – Diptera, 3 – Coleoptera, 4 – Hymenoptera, 5 – Homoptera, 6 – Hemiptera, 7 – Ephemeroptera, 8 – Trichoptera, 9 – Neuroptera, 10 – Raphidioptera

преобладали насекомые мелких размеров тела до 10 мм (77,4 % от общего числа всех насекомых). Из них 2/3 имеют размеры тела меньше 5 мм. Крупные насекомые с размером тела более 20 мм являлись единичными (0,5 % от общего числа всех насекомых), и отмечены в отрядах Trichoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Coleoptera (рис. 2). Особи мелкой размерной категории (до 10 мм) преобладали среди Hemiptera (100 %), Coleoptera (87,4 %), Homoptera (100 %), Hymenoptera (92,4 %), Diptera (94,4 %). Доля насекомых средних размеров – от 10 до 20 мм – оказалась значительной для Lepidoptera (47,4 %), Trichoptera (90,5 %) и Ephemeroptera (51 %). Таким образом, в составе изученного энтомокомплекса преобладают насекомые мелких и средних размерных категорий с мягким и твердым хитиновым покровом.

**Потенциальная трофическая ниша рукокрылых.** На территории Среднего Урала и прилегающих равнинных районов отмечены 10 видов рукокрылых (табл. 2) [Большаков и др., 2005]. Из них в условиях равнинного Среднего Зауралья встречается шесть: оседлые – ночные прудовая *Myotis dasycneme* Boie (относительное обилие 1,1 %), водяная *M. daubentonii* Kuhl (13,8 %) и Брандта *M. brandtii* Eversmann (36,2 %), северный кожанок *Eptesicus nilssonii* Keyserling, Blasius (4,3 %); перелетные – двухцветный кожан

*Vespertilio murinus* L. (37,2 %) и лесной нетопырь *Pipistrellus nathusii* Keyserling, Blasius (7,4 %) [Первушина, Первушин, 2011]. Кроме того, здесь высока вероятность встречи бурого ушана (*Plecotus auritus* L.). Этот оседлый бореальный вид является обычным для Урала и отмечен в предгорьях Среднего Зауралья [Большаков и др., 2005].

Рацион разных видов рукокрылых имеет схожую структуру (см. табл. 2). Все отмеченные в наших сборах светоловушкой группы насекомых являются объектами питания животных. К основным компонентам рациона можно отнести Diptera, Trichoptera, Lepidoptera и Coleoptera.

Используя данные сборов светоловушки (обилие отрядов насекомых), мы рассчитали ширину потенциальной трофической ниши для рукокрылых Среднего Зауралья, индекс полидоминантности для нее составил 2,3. Чтобы сравнить эту величину с реальными сведениями о питании животных в изучаемом районе, нами определялась, по данным О. Р. Гизуллиной [2013], ширина реализованной трофической ниши для фонового вида – двухцветного кожана (индекс полидоминантности 3,9). Рацион этого вида изучен О. Р. Гизуллиной по экскрементам животных, отловленных вблизи места расположения нашей светоловушки, в июле 2012 г. Согласно этим данным, основу питания вида составляют многочисленные и в наших сборах представители отряда Diptera (Nematocera, Brachycera), их доля в рационе 42,2 %. Кроме того, кожаны поедают в большом количестве Homoptera (Aphididae, Cicadellidae), Coleoptera (17,6 и 17,8 % соответственно) и небольшую долю Hemiptera (8,4 %), Neuroptera (Chrysopidae, Hemerobiidae) (6,9 %), Lepidoptera (3 %), Trichoptera (2,4 %), Hymenoptera (Ichneumonidae) (1,4 %). Реализованная трофическая ниша фонового вида [Гизуллина, 2013] и учтенная нами потенциальная ниша хорошо перекрываются (индекс Мориситы 0,84). В этом случае речь не идет о понятии фундаментальной трофической ниши, предложенной Хатчинсоном. Индекс показывает, что описанная выше таксономическая структура сообщества ночных насекомых имеет сходные черты с перечнем пищевых объектов двухцветного кожана в исследуемом районе.

Таблица 2

## Структура рациона рукокрылых Среднего Урала

Группы членистоногих	Виды рукокрылых (размеры тела, мм)						
	<i>E. nislsonii</i> [50–60]	<i>Pl. auritus</i> [38–47]	<i>M. dasycneme</i> [51–73]	<i>M. daubentonii</i> [40–58]	<i>M. myotacinus</i> [37–47]	<i>M. nattereri</i> [39–43]	* <i>P. nathusii</i> [45–56]
Класс Arachnida							
Araneae, Opiliones	0,8	17,6	—	3,6	—	17,4	0,5
Класс Chilopoda	—	5,9	—	—	—	0,8	—
Класс Insecta							
Ephemeroptera	10,0	10,0	—	1,6	—	—	1,02
Plecoptera	10,0	10,0	—	—	—	10,0	10,0
Orthoptera	—	—	—	—	—	—	0,3
Dermaptera	1,1	7,4	—	4,0	—	—	0,3
Psocoptera	—	—	—	—	—	—	2,2
Homoptera	—	—	3,2	8,7	1,3	—	—
Hemiptera	—	0,4	1,5	5,0	0,01	3,8	3,2
Hymenoptera	—	2,0	0,5	9,9	1,9	1,7	10,7
Coleoptera	18,2	8,0	5,5	9,4	12,9	2,6	4,9
Neuroptera	—	3,0	—	4,3	1,7	1,4	—
Trichoptera	9,8	10,0	37,5	23,5	1,6	11,5	12,7
Lepidoptera	17,1	27,0	43,3	4,6	44,8	70,0	5,4
Diptera	49,3	32,8	69,9	25,4	36,1	2,0	42,9
Всего групп	8	12	7	11	8	8	10
Литературные источники	[Курков, 1981; Рудел, 1989]	[Курков, 1981; Рудел, 1989]	[Zommer, 1997; Смирнов, 1991]	[Arnold et al., 2001; Flavin et al., 2001]	[Смирнов, Вехник, 2014]	[Смирнов, Вехник, 2014]	[Курков, 1981; Shiel et al., 1991]
Пиринна максимально реализованные тро- физические ниши ру- кокрылых	4,0	6,9	3,2	6,4	2,9	1,9	4,6
							3,3
							3,0
							4,6

Примечание. По литературным данным, полученным на территории Европы и европейской части России. Приведены максимальные значения обилия пищевых объектов. \*Перелетные формы рукокрылых.

Нас интересовало, подходит ли изученный энтомокомплекс в качестве кормовой базы неморальным видам летучих мышей – лесному нетопырю, рыжей вечернице (*Nyctalus noctula* Schreber), усатой ночнице (*Myotis mystacinus* Kuhl) и ночнице Наттерера (*M. nattereri* Kuhl) [Богдарина, Стрелков, 2003]. Для этого по литературным данным, полученным на территории Европы и европейской части России (см. табл. 2), мы рассчитали ширину максимально реализованной трофической ниши для всех видов рукокрылых, обитающих на Среднем Урале и Зауралье. Использовалось соотношение максимальных показателей обилия для той или иной группы корма. Максимально реализованная ниша оказалась у всех видов шире учтенной нами по данным светоловушки потенциальной ниши, в том числе шире реализованной в районе исследований ниши фонового вида – двухцветного кожана. Исключением является усатая ночница (индекс полидоминантности 1,9). Степень перекрывания потенциальной и максимальной ниш достаточно высока для прудовой ночницы, лесного нетопыря, северного кожанка и двухцветного кожана (индекс Мориситы от 0,89 до 0,95). Это означает, что таксономическая структура изученного энтомокомплекса в качестве кормовой базы наиболее подходит этим видам, в том числе единственному из неморальных видов – лесному нетопырю, который проникает в равнинное Среднее Зауралье по интразональным пойменным местообитаниям.

Но не только таксономическая структура энтомокомплекса – потенциальной кормовой базы – является определяющим фактором при выборе животными пищевых объектов, большое значение также имеет размер жертв. Ранее мы показали, что насекомые мелких и средних размерных категорий с мягким и твердым хитиновым покровом, преобладающие в наших сборах, составляют основу кормовой базы летучих мышей со средними размерами тела до 65 мм [Первушина и др., 2011]. Такие размеры тела характерны для большинства рукокрылых Среднего Урала и Зауралья (см. табл. 2). Исключением являются неморальный вид – рыжая вечерница и boreальный – прудовая

ночница. Они имеют относительно большие размеры тела, и поэтому их расселение в Среднем Зауралье может быть ограничено недостатком крупных объектов питания. Для этих видов отмечена узкая ширина максимально реализованной ниши – индекс меньше 3,2 (см. табл. 2). Это свидетельствует о большей их специализации в отношении потребляемых кормов и согласуется с литературными данными, полученными на территории Самарской Луки [Смирнов, Вехник, 2014]. Возможно, низкое разнообразие потребляемых кормов у этих видов компенсируется более высоким обилием и крупными размерами поедаемых насекомых. Данное предположение подтверждает тот факт, что на небольших речках с относительно низким обилием насекомых, типичных для ландшафта равнинного Среднего Зауралья, крайне мала плотность прудовой ночницы, хотя ее кормовые стации тесно связаны с водемами. В сравнении с ней близкая по экологии, но более мелкая по размерам водяная ночница в Среднем Зауралье – обычный вид; она, наоборот, успешно осваивает небольшие реки, возможно, благодаря тому, что компенсирует относительно низкое обилие корма широким спектром пищевых объектов (индекс ширины максимальной трофической ниши – 6,4).

Что касается рыжей вечерницы, то этот неморальный перелетный вид населяет преимущественно зону широколиственных и смешанных лесов, лесостепь и пустыни, проникает из европейской части России на территорию Южного Урала, встречается на юге Западной Сибири. Находки вида в пределах Среднего Урала известны только на западном макросклоне в Пермской обл. [Большаков и др., 2005]. В рационе рыжей вечерницы наряду с мелкими насекомыми, например, Diptera, важное место занимают достаточно крупные (более 20 мм) жуки семейств Семирамбиды, Lucanidae и бабочки семейств Lasiocampidae, Sphingidae [Сологор, Петрученко, 1973; Курсков, 1981]. Поэтому, возможно, пищевые предпочтения могут ограничивать расселение этого вида в северные районы Западно-Сибирской равнины, в том числе и в равнинное Среднее Зауралье, где кормовая база летучих мышей представле-

на в основном насекомыми мелких и средних размеров, а их разнообразие и обилие ниже, чем известно для европейской части России.

Для остальных неморальных видов – ночных усатой и Наттерера – не просматривается явной связи пищевых предпочтений с отсутствием в Среднем Зауралье. Трофическая ниша усатой ночницы имеет большое сходство с рационом близкородственного вида – ночницы Брандта ( $K_{sc} = 0,5$ ). К тому же усатая ночница, обычна на западном макросклоне Среднего Урала в Среднем Предуралье, не встречается на востоке в равнинном Среднем Зауралье выше  $57^{\circ}$  с. ш., тогда как численность ночницы Брандта в этом районе существенно увеличивается [Первушина, Первушин, 2011]. Следовательно, между этими двумя видами возможна конкуренция за пищевые ресурсы. Но полученные в экотонных сообществах Самарской Луки данные свидетельствуют об обратном [Смирнов, Вехник, 2014]: выявлены различия между видами по частоте встречаемости кормовых объектов; в этом случае индекс перекрывания трофических ниш видов соответствует средним значениям. Основную часть в дите обоих видов составляют Lepidoptera, но в питании усатой ночницы большое значение имеют Trichoptera, а у ночницы Брандта, напротив, Coleoptera и Diptera. Такие различия в питании, по мнению авторов, обусловлены разными пространственными нишами и стратегией кормодобывания видов. Небольшие значения индекса ширины максимальной трофической ниши, полученные нами для этих двух видов, мы объясняем недостатком сведений об их питании.

В рационе еще одного неморального вида – ночницы Наттерера – много общего с бурым ушаном ( $K_{sc} = 0,47$ ). Оба вида поедают значительную долю короткоусых двукрылых подотряда Brachycera (Calliphoridae, Muscidae, Rhagionidae) и бескрылых членистоногих (Arachnida и Chilopoda). Из-за схожей стратегии кормодобывания, а именно способности схватывать добычу с поверхности, эти виды относят к группе “присадников”, хотя их трофические ниши различаются по обилию кормов [Shiel et al., 1991]. Ушан по сравнению с ночницей Наттерера

имеет очень широкий спектр питания (индекс ширины максимальной трофической ниши – 6,9), и, вероятно, поэтому встречается в пределах всей умеренной зоны Евразии. На Среднем Урале он является обычным, но малочисленным [Большаков и др., 2005]. Напротив, ночница Наттерера преимущественно населяет смешанные и лиственные леса европейского типа. Эти кормовые стации могут быть для нее наиболее подходящими, так как характеризуются мощной листовой подстилкой с высокой плотностью наземных членистоногих, важных для питания вида. Более точные сведения, подтверждающие это предположение, пока отсутствуют.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таксономическая структура сообщества насекомых равнинного Среднего Зауралья имеет много общего со структурой лесных энтомокомплексов европейской части России и Западной Сибири. Главным образом в его составе отмечены широко распространенные в умеренной зоне Евразии виды насекомых. Разнообразие и численность групп определены в большей степени биотопическими особенностями района исследований. Благодаря сочетанию разных биотопов, в сборах представлены насекомые, связанные с водными, луговыми и лесными растительными сообществами, а также с селитебными территориями человека.

Данная таксономическая структура энтомокомплекса как потенциальная кормовая база в той или иной степени подходит всем видам рукокрылых, обитающим на территории равнинного Среднего Зауралья. Она динамична и показывает особенности учтенной потенциальной трофической ниши видов в конкретный момент времени. Размерная структура энтомокомплекса характеризуется значительным преобладанием потенциальных кормовых объектов мелких и средних размеров. Небольшое количество насекомых крупных размеров (более 20 мм) может быть фактором, ограничивающим расселение видов рукокрылых с размерами тела больше 65 мм. К ним относится прудовая ночница. Мы предполагаем, что низкая численность это-

го вида в районе исследований обусловлена недостатком кормовых ресурсов, а именно низким обилием подходящих пищевых объектов, в том числе крупноразмерных. Вероятно, по этой же причине на территории равнинного Среднего Зауралья не встречается перелетный неморальный вид – рыжая вечерница. Сведения о питании других представителей “неморальной фауны” – ночниц усатой и Наттерера – не позволяют делать подобных предположений. По-видимому, отсутствие этих оседлых видов на территории равнинного Среднего Зауралья обусловлено другими причинами.

Авторы выражают признательность Г. Н. и В. Н. Бачуриным за возможность проведения исследований на территории Экологического научно-просветительского центра “Скородум”, благодаря сотруднику СОКМ А. А. Первушину за помощь в сборах насекомых и сотруднику ИЭРиЖ УрО РАН, д-ра биол. наук И. А. Богачеву за ценные советы при подготовке статьи. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 12-04-31257.

## ЛИТЕРАТУРА

- Богдарина С. В., Стрелков П. П. Распространение рукокрылых (Chiroptera) на севере европейской части России // Plecotus et al. 2003. № 6. С. 7–28.
- Большаков В. Н., Орлов О. Л., Снитько В. П. Летучие мыши Урала. Екатеринбург: Академкнига, 2005. 176 с.
- Гизуллина О. Р. Пищевые предпочтения двухцветного кожана (Chiroptera, Vespertilionidae) в Среднем Зауралье // Экология: теория и практика: мат-лы конф. молодых ученых, 15–19 апреля 2013 г. ИЭРиЖ УрО РАН. Екатеринбург: Гошицкий, 2013. С. 22–24.
- Горностаев Г. Н. Введение в этологию насекомых-фотоксенов (лет насекомых на искусственные источники света) // Этология насекомых. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1984. С. 101–167. (Тр. ВЭО; Т. 66).
- Замшина Г. А. С чем связаны различия в уровнях обилия у разных видов чешуекрылых *Heterocera*? // Проблемы глобальной и региональной экологии: материалы конф. молодых ученых, 31 марта – 4 апреля 2003. Екатеринбург, 2003. С. 50–55.
- Коломиец Н. Г., Терсков И. А. Лесные насекомые Сибири, реагирующие на ультрафиолетовый свет // Изв. СО АН СССР. Сер. Биол.-мед. наук. 1963. № 12, вып. 3. С. 82–90.
- Курсков А. Н. Рукокрылые Белоруссии. Минск: Наука и техника, 1981. 136 с.
- Лесорастительные условия и типы лесов Свердловской области: практ. руководство / под ред. Б. П. Колесникова [и др.]. Свердловск, 1973. 176 с.
- Николаева Н. В. Кровососущие комары – потенциальные переносчики инфекций на Урале // Экологические проблемы горных территорий: мат-лы Междунар. науч. конф., 18–20 июня 2002 г. Екатеринбург, 2002. С. 266–269.
- Ольшванг В. Н., Нуупонен К. Т., Лагунов А. В., Горбунов П. Ю. Чешуекрылые Ильменского заповедника. Екатеринбург: ИГЗ УрО РАН, 2004. 288 с.
- Первушина Е. М., Первушин А. А. Новые сведения о рукокрылых (Chiroptera, Vespertilionidae) Свердловской области // Plecotus et al. 2011. Вып. 14. С. 19–25.
- Первушина Е. М., Замшина Г. А., Николаева Н. В., Федякина М. А. Трофические связи насекомоядных рукокрылых на юге Среднего Урала // Вестн. Удмурт. ун-та. Биология. Науки о Земле. 2011. Вып. 3. С. 65–74.
- Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М.: Наука, 1982. 287 с.
- Смирнов Д. Г., Вехник В. П. Экология питания и дифференциация трофических ниш рукокрылых (Chiroptera: Vespertilionidae) в пойменных экосистемах Самарской Луки // Изв. РАН. Сер. биологическая. 2014. № 1. С. 53–64.
- Сологор Е. А., Петрусенко А. А. К изучению питания рукокрылых (Chiroptera) Среднего Приднепровья // Вестн. зоологии. Киев, 1973. Вып. 3. С. 40–45.
- Arnold A., Braun M., Becker N., Storch V. Contribution to the trophic ecology of bats in the upper Rhine Valley, southwest Germany // Proc. of the VIII<sup>th</sup> EBRS. Chiropterological Krakow, 2001. Vol. 2. P. 17–27.
- Bauerova Z., Ruprecht A. L. Contribution to the knowledge of the trophic ecology of the parti-coloured bat, *Vespertilio murinus* // Folia Zoologica. 1989. Vol. 38, N 3. P. 227–232.
- Flavin D. A., Biggane S. S., Shiel C.B., Smiddy P., Fairley J. S. Analysis of diet of Daubenton's bat *Myotis daubentonii* in Ireland // Acta Theriologica. 2001. Vol. 46, N 1. С. 43–52.
- Shiel C. B., McAney C. M., Fairley J. S. Analysis of the diet of Natterer's bat *Myotis nattereri* and the common long-eared bat *Plecotus auritus* in the West of Ireland // J. Zool. 1991. Vol. 223. P. 299–305.

Rydell J. Food habits of northern (*Eptesicus nilssonii*) and brown long-eared (*Plecotus auritus*) bats in Sweden // Holarctic Ecology. 1989. Vol. 12. P. 16–20.

Zommer R., Zommer S. Ergebnisse zur Kotanalyse bei Teichfledermäusen, *Myotis dasycneme* (Boie, 1825) // Myotis. 1997. N 3. P. 103–107.

## The structure of the Entomocomplex and its Role in the Feeding of Bats in the Plains of Middle Trans-Urals

E. M. PERVUSHINA<sup>1</sup>, G. A. ZAMSHINA<sup>1</sup>, N. V. NIKOLAYEVA<sup>1</sup>, A. V. IVANOV<sup>1</sup>,  
V. N. OLSCHWANG<sup>1</sup>, T. S. KOSTROMINA<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS  
620144, Yekaterinburg, 8 Marta str., 202

E-mails: [pervushina@ipae.uran.ru](mailto:pervushina@ipae.uran.ru), [galinka\\_1976@mail.ru](mailto:galinka_1976@mail.ru), [zoovginnv@pm.convex.ru](mailto:zoovginnv@pm.convex.ru),  
[fluegel@yandex.ru](mailto:fluegel@yandex.ru), [olschw@mail.ru](mailto:olschw@mail.ru)

<sup>2</sup> Sverdlovsk Museum of Regional Studies  
620151, Yekaterinburg, General P.O. Box 207  
E-mail: [kostromina\\_ts@mail.ru](mailto:kostromina_ts@mail.ru)

The taxonomic and size structure of the community of twilight and nocturnal insects inhabiting the plains of Middle Trans-Urals was studied. The studied community was represented by insects of 10 orders, predominantly small (up to 5 mm) and middle-sized (up to 20 mm). This insect community was regarded as potential food supply for the bats – a potential trophic niche. The effect of food preferences on the possibility of distribution of the nemoral bat species in the region of study was discussed.

**Key words:** community of nocturnal insects, bats, feeding, the Middle Urals.